

## BEDFORD ALZHEIMER NURSING SEVERITY SCALE (BANSS)

Indicatori	Variabili
<b>ABBIGLIAMENTO</b>	[1] abitualmente indipendente [2] richiede assistenza minima [3] richiede discreta assistenza ma non è totalmente dipendente [4] completamente dipendente
<b>SONNO</b>	[1] ciclo sonno-veglia abitualmente regolare [2] talvolta irregolare [3] frequentemente irregolare [4] ciclo sonno-veglia severamente sovvertito
<b>LINGUAGGIO</b>	[1] conservato [2] lieve incapacità a parlare [3] saltuaria incapacità [4] afasia completa
<b>ALIMENTAZIONE</b>	[1] indipendente [2] richiede assistenza minima e/o sollecitazione [3] richiede moderata assistenza e/o sollecitazione [4] completamente dipendente
<b>MOBILITÀ</b>	[1] deambula sempre in modo indipendente [2] talvolta deambula in modo indipendente [3] deambula solo con aiuto [4] incapace a deambulare anche con aiuto
<b>MUSCOLATURA</b>	[1] molto sciolta con motilità articolare pienamente conservata [2] parzialmente sciolta con lieve compromissione della motilità articolare [3] parzialmente rigida [4] contratta
<b>CONTATTO OCULARE</b>	[1] mantenuto [2] abitualmente mantenuto [3] raramente mantenuto [4] completamente perduto

**PUNTEGGIO COMPLESSIVO \_\_\_\_\_/28**

La scala di valutazione BANSS consente di ottenere informazioni sulla condizione funzionale/cognitiva del paziente. Il punteggio ottenuto è contenuto nell'intervallo tra 7 e 28 ed è direttamente proporzionale alla gravità della malattia.